摛藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御纂醫宗金鑑卷五十二

詳校官主事臣陳木



欽定四庫全書薈要

御纂醫宗金鑑卷五十二

編輯幼科雜病心法要訣目錄

疳證門

疳證總括

脾疳

消疳理脾湯

肥兒丸

肝疳

柴胡清肝散

蘆薈肥兒丸


加味逍遙散

抑肝扶脾湯

心疳


瀉心導赤湯


珍珠散




疳熱


腦疳







牙疳







傷食吐
三棱丸
和胃湯
夾驚吐
全蠍觀音散
定吐丸
痰飲吐
二陳湯



香砂六君子湯

蟲吐

化蟲丸


加減理中湯


虛吐


丁沉四君子湯

實吐

三一承氣湯







驚瀉

益脾鎮驚散

養脾丸


臍寒瀉

和氣飲

調中湯

脾虛瀉

參苓白术散



飧瀉

補中益氣湯

四神丸

水瀉

胃苓湯

升陽除濕湯

欽定四庫全書薈要卷一萬五百六子部

御纂醫宗金鑑卷五十二

編輯幼科雜病心法要訣

疳證門

疳證總括

大人為勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液被熬煎初患尿泔午潮熱日久青筋肚大堅面色青黃肌肉瘦皮毛憔悴眼睛瞪

註大人者十五歲以上也病則為勞若十五歲以下者皆名為疳緣所禀之氣血虛弱藏府嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳化遲滯腸胃漸傷則生積熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午後潮熱日久失治致令青筋暴露肚大堅硬面色青黄肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發眨而疳證成矣然當分其所屬而治之庶不致有悮也

脾疳

脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿腫脹臥冷食泥腹痛堅頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥黏攻積消疳肥兒治補脾參苓白朮先

註脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞硬乳食懶進睡臥喜冷好食泥土肚腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥黏之證也宜先攻其積用消疳

理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以參苓

白术散主之

消痞理脾湯

蕪荑　三稜

莪术　青皮炒

陳皮　蘆薈

檳榔　史君子肉

甘草生　川黄連

胡黃連　麥芽炒

神麴炒


引用燈心水煎服

方歌 消疳理脾用蕪荑三棱莪朮青陳皮蘆薈檳榔史君草川連胡連麥芽麴

肥兒丸

人參二錢半　白朮五錢土炒

茯苓三錢　黃連二錢



胡黃連五錢　史君子四錢肉

神麯炒　麥芽炒


山查肉各三錢半　甘草錢半炙

蘆薈二錢半煨

右為末黃米糊丸如黍米大每服二三十丸米湯化下

參苓白术散

人參二錢　茯苓



白朮土炒　扁豆炒

薏米炒　山藥炒各五錢

陳皮三錢　縮砂

桔梗各二錢　甘草炙一錢

建蓮子五錢去心

右共為細末每服一錢老米湯調服

疳瀉

疳疾傷脾因作瀉先清後補為妙訣初宜清熱和中湯

久瀉參苓白朮捷
註 痞瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分頻頻作瀉法當清熱滲濕以清熱和中湯主之若瀉久不愈當漸爲調理參苓白朮散主之

清熱和中湯

白朮土炒 陳皮
厚樸薑炒 赤苓
黄連 神麯

穀芽炒　　史君子

生甘草　　澤瀉

引用燈心水煎服

方歌 痞久泄瀉名痞瀉清熱和中功甚捷白朮陳厚赤

苓連神穀史君草澤瀉

參苓白朮散方見脾疳

疳腫脹

疳疾腫脹面浮光傳化失宜脾肺傷氣逆喘咳胸膈滿

御苑匀氣服最良

註 痦疾腫脹之證多因傳化失宜以致脾肺兩傷現證氣逆喘咳胸膈痞悶肚腹腫脹面色浮光宜用御苑匀氣散治之其腫脹自消矣

御苑匀氣散

桑皮蜜炒　桔梗

赤苓　甘草生

藿香　陳皮

木通

引用薑皮燈心水煎服

方歌 痦久脾虚腫脹生御苑匀氣有奇功桑皮桔梗赤苓草藿香陳皮合木通

痦痢

痦疾日久頻下痢多緣腸胃熱凝滞或赤或白腹窘急香連導滞為妙劑

註 痦痢之由皆因熱結腸胃所致故痢時或赤或白

腹中窘痛急用香連導滯湯治之其痢自愈

香連導滯湯

青皮炒　陳皮

厚樸薑炒　川黄連薑炒

生甘草　山查

神麯炒　木香煨

檳榔　大黄

引用燈心水煎服

方歌 疳久下痢名疳痢香連導滯功最良青陳厚樸川
連草査麯木香檳大黄

肝疳

肝疳面目爪甲青眼生眵淚澁難睜搖頭揉目合面卧
耳流膿水濕瘡生腹大青筋身羸瘦燥渴煩急糞帶青
清熱柴胡同蘆薈調養逍遥抑肝靈

註 肝屬木色青主筋故肝疳則見面目爪甲皆青眼
生眵淚隱澁難睜搖頭揉目合面睡卧耳瘡流膿

腹大青筋身體羸瘦燥渴煩急糞青如苔之證也

治宜先清其熱用柴胡清肝散蘆薈肥兒丸主之

若病勢稍退當以逍遙散抑肝扶脾湯調理

柴胡清肝散

銀柴胡　梔子微炒

連翹去心　胡黃連

生地黃　赤芍

龍膽草　青皮炒

甘草生

引用燈心竹葉水煎服

方歌 柴胡清肝治肝疳銀柴梔子翹胡連生地赤芍龍

膽草青皮甘草一同煎

蘆薈肥兒丸

五穀蟲炒二兩　蘆薈生

胡黄連炒　川黄連薑炒各一兩

銀柴胡炒一兩二錢　扁豆炒

山藥炒各二兩　南山查二兩半

蝦蟇煆四個　肉豆蔻煨七錢

檳榔五錢　史君子炒二兩半

神麯炒二兩　麥芽炒一兩六錢

鶴虱炒八錢　蕪荑炒一兩

硃砂飛二錢　麝香二錢

共研細末醋糊為丸如黍米大每服一錢米飲下

加味逍遥散

茯苓　白朮炒

當歸　白芍炒

柴胡　薄荷

炙甘草　丹皮

梔子炒

引用薑棗水煎服

方歌　加味逍遥散如神茯苓白朮當歸身白芍柴胡薄荷草再加丹皮梔子仁

抑肝扶脾湯

人參　白朮土炒

黃連薑炒　柴胡酒炒

茯苓　青皮醋炒

陳皮　白芥子

龍膽草　山查

神麴炒　炙甘草

引用薑棗水煎服

方歌 調理抑肝扶脾湯參朮黃連柴苓良青陳白芥龍膽草山查神麯甘草嚐

心疳

心疳面赤脈絡赤壯熱有汗時煩驚咬牙弄舌口燥渴口舌生瘡小便紅胸膈滿悶喜伏臥懶食乾瘦吐利頻瀉心導赤珍珠治茯神調理可收功

註 心屬火色赤主血脈故心疳則見面紅目脈絡赤壯熱有汗時時驚煩咬牙弄舌口舌乾燥渴飲生

瘡小便紅赤胸膈滿悶睡喜伏卧懶食乾瘦或吐或利也熱盛者瀉心導赤湯主之熱盛兼驚者珍珠散主之病久心虛者茯神湯調理之


瀉心導赤湯 方見木舌

珍珠散

珍珠三錢 麥冬五錢去心

天竺黄三錢 金箔二十五片

牛黄一錢 胡黄連三錢



生甘草二錢　羚羊角

大黄　當歸各三錢

硃砂二錢　雄黄一錢

茯神五錢　犀角三錢

右為細末每服五分茵蔯湯調服

茯神湯

茯神　當歸

炙甘草　人參

引用龍眼肉水煎服

煩熱者加麥冬

方歌 茯神湯內用茯神當歸甘草共人參若是煩熱麥冬入清補兼施功最純

疳渴

肥甘積熱傷津液大渴引飲心煩熱速用清熱甘露宜熱滅津生渴自歇

註 疳渴者多因肥甘積熱煎耗脾胃以致津液虧損

故不時大渴引飲心神煩熱速用清熱甘露飲其渴自愈

清熱甘露飲

生地黄　麥冬去心

石斛　知母生

枇杷葉蜜炙　石膏煅

甘草生　茵蔯蒿

黄芩

引用燈心水煎服

方歌 耗液傷津成疳渴清熱甘露飲如神生地麥冬斛知母枇杷石膏草茵苓

肺疳

面白氣逆時咳嗽毛髮焦枯皮粟乾發熱憎寒流清涕鼻頰生瘡號肺疳疎散生地清肺效清熱甘露飲為先肺虛補肺散最妙隨證加減莫遲延

註 肺屬金色白主皮毛故肺疳則見面白氣逆咳嗽

毛髮枯焦皮上生粟肌膚乾燥憎寒發熱常流清涕鼻類生瘡也先用生地清肺飲以疎解之繼用甘露飲清之日久肺虚者當以補肺散主之

生地清肺飲

桑皮炒　生地黄

天冬　前胡

桔梗　蘇葉

防風　黄芩

生甘草　當歸

連翹去心　赤苓

引用生薑紅棗水煎服


方歌生地清肺用桑皮生地天冬前桔齊蘇葉防風黄

苓草當歸連翹赤苓宜

甘露飲

生地黄　熟地黄

天冬　麥冬去心



枳殼 麩炒　桔梗

黄芩　枇杷葉 蜜炙

茵蔯蒿　石斛

引用紅棗肉水煎服

方歌 甘露飲治肺火壅生熟地黄二門冬枳桔黄芩枇

把葉茵蔯石斛共煎成

補肺散

白茯苓　阿膠 蛤粉炒

糯米　馬兜鈴

炙甘草　杏仁炒去皮尖

水煎服

方歌　肺虛補肺散通仙茯苓阿膠糯米攢馬兜鈴配炙甘草杏仁微炒去皮尖

腎疳

解顱鶴膝齒行遲骨瘦如柴面黑黧齒齦出血口臭氣足冷腹痛瀉哭啼腎疳先用金蟾治九味地黃繼進宜

若逢禀賦氣虛弱調元散進莫遲疑

註腎屬水色黑主骨患此疳者初必有解顱鶴膝齒遲行遲腎氣不足等證更因甘肥失節久則漸成腎疳故見面色黧黑齒齦出血口中氣臭足冷如氷腹痛泄瀉啼哭不已之證先用金蟾丸治其疳繼以九味地黄丸調補之若禀賦不足者調元散主之

金蟾丸

乾蝦蟇五個煆　胡黃連

黃連各三錢　鶴蝨二錢

肉豆蔻煨　苦楝根白皮


雷丸　蘆薈生

蕪荑各三錢

右為末麪糊為丸菉豆大雄黃為衣每服十五丸

米湯化下

九味地黃丸



熟地　茱萸肉各五錢
赤茯苓　澤瀉
牡丹皮　山藥炒
當歸　川楝子
史君子肉各三錢
右為細末煉白蜜為丸如芡實大用滚白水研化
食前服
調元散

人參　茯苓

白朮土炒　山藥炒

川芎　當歸

熟地黃　茯神

黃耆炙　甘草炙

白芍炒

引用薑棗水煎服

方歌　調元散治稟賦弱參苓白朮乾山藥芎歸熟地共

茯神黄耆甘草同白芍

疳熱

小兒疳疾身發熱輕重虛實當分别初用青蒿飲為宜日久鼈甲散最捷

註疳疾之證身多發熱治者宜分别輕重虛實治之病初起多實者鼈甲青蒿飲主之日久多虛者鼈甲散主之

鼈甲青蒿飲

銀柴胡　鼈甲炙

青蒿　生甘草

生地黄　赤芍

胡黄連　知母炒


地骨皮

引用燈心水煎服

方歌

疳疾血虛身發熱鼈甲青蒿藥有靈銀柴鼈蒿草

地芍胡連知母地骨同



鱉甲散

人參　黄耆炙

鱉甲炙　生地

熟地　當歸

白芍炒　地骨皮


水煎服

方歌　癆疾日久骨熱蒸鱉甲散治效從容參耆鱉甲生熟地當歸白芍地骨同

腦疳

腦疳多緣受風熱又兼乳哺失調節頭皮光急生餅瘡頭熱髮焦如穗結鼻乾心煩腮顖腫困倦睛暗身汗熱龍膽龍腦丸甚良吹鼻龍腦效甚捷

註 腦疳者因兒素受風熱又兼乳哺失調以致變生此證頭皮光急腦生餅瘡頭熱毛焦髮結如穗鼻乾心煩腮顖腫硬困倦睛暗自汗身熱也腦熱生瘡者龍膽丸主之煩熱羸瘦者龍腦丸主之外用



吹鼻龍腦散吹之其證自愈

龍膽丸

龍膽草　升麻

苦楝根皮焙　赤茯苓

防風　蘆薈

油髮灰各二錢　青黛

黃連各三錢

右為細末豬膽汁浸糕糊丸如麻子大薄荷湯下

量兒大小與之

龍腦丸

龍腦　麝香各五分


雄黄二錢　胡黄連三錢

牛黄一錢　硃砂一錢五分

蘆薈三錢生　乾蝦蟇四錢灰

右為細末熊膽合丸如麻子大每服三丸薄荷湯

下



吹鼻龍腦散

龍腦　麝香少許各研細末

蝸牛殼炒黄　蝦蟇灰

瓜蒂　黄連

細辛　桔梗各等分


右為細末入磁盆内貯之每取少許吹入鼻中日吹二次

眼疳

疳熱上攻眼疳成癢澁赤爛胞腫疼白睛生翳漸遮滿
流淚羞明目不睜疎解瀉肝散最妙雲翳清熱退翳靈
目久不瘥當補養逍遥瀉肝二方從

註眼疳者疳熱上攻於眼故發時癢澁赤爛眼胞腫
疼白睛生翳漸漸遮滿不時流淚羞明閉目也先
用瀉肝散疎解之再用清熱退翳湯消其翳若目
久不瘥法當調補逍遥散或羊肝散主之

瀉肝散



生地黃　當歸

赤芍　川芎

連翹去心　梔子生

龍膽草　大黃

羌活　甘草生

防風

引用燈心水煎服

方歌　瀉肝散治肝熱壅生地當歸赤芍芎連翹梔子龍

膽草大黄羌活草防風

清熱退翳湯

梔子微炒　胡黄連


木賊草　赤芍

生地　羚羊角

龍膽草　銀柴胡

蟬蛻　甘草

菊花　蒺藜



引用燈心水煎服

方歌 清熱退翳消雲翳梔連木賊芎生地羚羊龍膽銀柴胡蟬蛻甘草菊蒺藜

逍遥散 方見肝疳

羊肝散

青羊肝一具去筋膜切韭葉厚片

人參　羌活

白术土炒　蛤粉各等分

右為細末令勻聽用將藥置荷葉上如錢厚一層鋪肝一層包固外以新足青布包裹蒸熟任兒食之如不食者及夏月恐腐壞則晒乾為末早晚白湯調服服完再合以好為度若熱者減人參

鼻疳

疳熱攻肺成鼻疳鼻塞赤癢痛難堪浸淫潰爛連脣際咳嗽氣促髮毛乾熱盛清金化毒效疳蟲蝕鼻化蟲丸調敷須用鼻疳散吹鼻蟬殼效通仙

註鼻痔者因痔熱攻肺而成蓋鼻為肺竅故發時鼻塞赤癢疼痛浸淫潰爛下連唇際成瘡咳嗽氣促毛髮焦枯也熱盛者宜清金散蔣氏化毒丹主之𧓍蝕者用化𧓍丸主之外用鼻痔散敷之或以吹鼻蟬殼散吹入鼻内

清金散

生梔子　黄芩

枇杷葉蜜炙　生地黄

花粉　連翹去心

麥冬去心　薄荷

玄參　生甘草


桔梗

引用燈心水煎服

方歌　清金散治肺壅熱梔子黃芩枇杷葉生地花粉翹

麥冬薄荷玄參甘草桔

蔣氏化毒丹方見胎赤



化蟲丸

蕪荑　蘆薈生

青黛　川芎

白芷梢　胡黄連

川黄連　蝦蟇灰各等分

右為細末豬膽汁浸糕為丸如麻子大每服二十

丸食後杏仁煎湯下

鼻疳散

青黛一錢　麝香少許

熊膽五分

右為細末乾者用豬骨髓調貼濕者乾上

吹鼻蟬殼散

蟬殼微炒　青黛研

蛇蛻皮灰　滑石

麝香各等分細研

右為細末每用菉豆大吹入鼻中日三用之疳蟲

盡出

牙疳

疳成毒熱內攻胃上發齦肉赤爛疼口鼻血出牙枯落穿腮蝕唇命多傾攻毒消疳蕪荑效繼以蘆薈肥兒靈外用牙疳散時上能食堪藥始能生

註牙疳者因毒熱攻胃而成故熱毒上發齦肉赤爛疼痛口臭血出牙枯脫落穿腮蝕唇病勢危急用消疳蕪荑湯瀉其毒熱繼以蘆薈肥兒丸清其

餘熱外用牙疳散時時敷之自愈總之此證必胃
強能食堪勝峻藥始有生機否則難治也

消疳蕪荑湯


大黄　芒消

蕪荑　蘆薈生

川連　胡黄連

黄芩　雄黄

水煎服服後便軟及不食者去大黄芒消加石膏



羚羊角

方歌 蕪荑消疳大黃消蘆薈蕪荑二連標黃芩雄黃一

同入能清積熱牙疳消

蘆薈肥兒丸 方見肝疳

牙疳散

人中白 煅存性　綠礬 燒紅

五倍子 各等分炒黑　氷片 少許


右為極細末先用水拭淨牙齒再以此散敷之有

蟲者加檳榔

脊疳

積熱生蟲蝕脊膂手擊其背若鼓鳴羸瘦脊骨鋸齒狀身熱下利煩渴增十指皆瘡齧爪甲此名脊疳病熱凶蘆薈丸同金蟾散急急調治莫從容

註 脊疳者因積熱生蟲上蝕脊膂也以手擊其背必空若鼓鳴脊骨羸瘦狀若鋸齒始為脊疳外證亦身體發熱下利煩渴十指皆瘡頻齧爪甲其證最



為可畏須先以蘆薈丸殺其蟲繼用金蟾散消其

疳隨時調治或可愈也

蘆薈丸

生蘆薈　青黛

硃砂　熊膽

胡黃連　貫衆

地龍微炒　川黃連

蟬蛻去足　雷丸各五錢

麝香一錢　蝦蟇一個酥塗炙焦

右為細末用蝸角肉研和丸如麻子大每服五丸粥飲下量兒大小與之


金蟾散

蟾一枚酥塗炙焦　夜明沙炒

桃白皮　樗根白皮

地榆　黄蘗

訶黎勒皮煨　百合



人參 大黄

白蕪荑炒 胡粉各三錢

檳榔一錢 丁香三十七粒

右為細末每服五分粥飲調下

蛔疳

過食臟冷並肥甘濕熱生蛔腹內纏時煩多啼時腹痛

口脣色變溢清涎腹脹青筋肛濕癢史君散治莫遲延


不愈下蟲丸極致蛔退補脾肥兒丸

註蛔疳者因過食生冷油膩肥甘之物以致濕熱生蛔腹中擾動故有時煩躁多啼有時肚腹攪痛口脣或紅或白口溢清涎腹脹青筋肛門濕癢也先用史君子散治之不愈下蟲丸主之若蛔退又當調補其脾肥兒丸主之

史君子散

史君子十個瓦上炒為末　苦楝子五個泡去核

白蕪荑　甘草各一錢膽汁浸一宿



右為末每服一錢水煎服

下蟲丸

苦楝根皮新白者佳酒浸焙　木香

桃仁浸去皮尖　綠包貫衆

蕪荑焙　雞心檳榔各二錢

輕粉五分　鶴虱炒一錢

乾蝦蟇三錢炒黑　史君子三錢取肉煨

右為末麪糊成丸如麻子大每服二十丸滚白水

下

肥兒丸方見脾疳

無辜疳

無辜疳傳有二因鳥羽汚衣着兒身或緣乳母病傳染頸項瘡核便利膿蟲蝕臟腑身羸瘦面黄發熱致疳生清熱宜用柴胡飲消疳肥兒效如神

註無辜疳者其病原有二或因浣衣夜露被無辜鳥

落羽所污兒着衣後致成此證或因乳母有病傳染小兒以有此疾其證頸項生瘡或項内有核如彈按之轉動軟而不疼其中有蟲如米粉不速破之使蟲蝕臟腑便利膿血身體羸瘦面黄發熱也治宜先清其熱柴胡飲主之再消其疳以蘆薈肥兒丸主之

柴胡飲

赤芍藥　柴胡

黃連　半夏薑製

桔梗　夏枯草

龍膽草　浙貝母

黃芩　甘草生

引用燈心水煎服

方歌　柴胡飲治無辜疳赤芍柴胡川黃連半夏桔梗夏枯草龍膽浙貝芩草煎

蘆薈肥兒丸方見肝疳

丁奚疳

徧身骨露號丁奚肌肉乾澁晝夜啼手足枯細面黧黑項細腹大突出臍尻削身軟精神倦骨蒸潮熱渴煩急化滯五疳消積治補養人參啓脾宜

註丁奚者徧身骨露其狀似丁故名曰丁奚也其證肌肉乾澁啼哭不已手足枯細面色黧黑項細腹大肚臍突出尻削身軟精神倦怠骨蒸潮熱燥渴煩急也先用五疳消積丸化其滯繼用人參啟脾

丸理其脾病可漸愈矣

五疳消積丸

史君子肉五錢炒　麥芽炒

陳皮　神麯炒

山查各一兩　白蕪荑

黄連　膽草各三錢

右為末陳米飯為丸每服一錢米飲下

人參啓脾丸

人參五錢　白术土炒五錢
白茯苓五錢　陳皮四錢
扁豆炒五錢　山藥炒五錢
木香煨二錢　穀芽炒三錢
神麯炒三錢　炙甘草二錢
右研細末煉蜜為丸重一錢用建蓮湯化下

哺露疳

乳食不節傷脾胃羸瘦如柴哺露成吐食吐蟲多煩渴


頭骨開張晡熱蒸先用集聖消積滯繼用肥兒甚有靈

若還腹大青筋現人參丸服莫從容

註哺露者因乳食不節大傷脾胃也其證羸瘦如柴吐食吐蟲心煩口渴頭骨開張日晡蒸熱先用集聖丸消其積滯再用肥兒丸調理其脾若哺露日久肚大青筋者又宜攻補兼施以人參丸主之

集聖丸

蘆薈微炒　五靈脂炒



夜明沙淘洗焙乾　縮砂

木香　陳皮

莪术　史君子肉

黃連　川芎酒洗炒

乾蟾各二錢炙　當歸一錢五分

青皮二錢製

右為細末用雄豬膽二箇取汁和麪糊為丸每服

一錢米飲送下

肥兒丸方見脾疳

人參丸

人參　麥冬去心


半夏薑製　大黄微炒

黄耆炙　茯苓

柴胡　黄芩

炙甘草　川芎

訶藜勒煨　鼈甲炙



右為細末煉蜜為丸如麻子大以粥飲下量兒大小用之

吐證門

吐證總括

諸逆上衝成嘔吐乳食傷胃或夾驚或因痰飲或蟲擾虛實寒熱要分明

註嘔吐一證皆諸逆上衝所致也夫諸逆之因或以乳食過多停滯中脘致傷胃氣不能健運而上逆

也或於食時觸驚停積不化而上逆也或痰飲壅盛阻隔氣道或蚘蟲擾亂懊憹不安而上逆也總之上逆之因雖不同而皆能成嘔吐也但病有虛有實有寒有熱治者當於臨證時參合兼見之證審慎以別之庶不誤矣

辨嘔吐噦證

有物有聲謂之嘔有物無聲吐證名無物有聲為噦證分別醫治中病情

註吐證有三曰嘔曰吐曰噦古人謂嘔屬陽明有聲有物氣血俱病也吐屬太陽有物無聲血病也噦屬少陽有聲無物氣病也獨李杲謂嘔吐噦俱屬脾胃虛弱潔古老人又從三焦以分氣積寒之三因然皆不外諸逆上衝也治者能分虛實别寒熱以治之自無不曲中病情矣

傷乳吐

乳食過飽蓄胃中乳片不化吐頻頻身熱面黄腹膨脹


消乳保和有神功

註 傷乳吐者因乳食過飽停蓄胃中以致運化不及吐多乳片猶如物盛滿而上溢也其證身熱面黃肚腹膨脹治宜消乳丸保和丸化其宿乳安胃和中節其乳食自然止也

消乳丸

香附 二兩製　神麯 炒

麥芽 各一兩炒　陳皮 八錢



縮砂仁炒　甘草炙各五錢

右為細末滴水為丸如粟米大量兒大小服之薑湯化下

保和丸

南山查二兩　神麯炒一兩

茯苓　半夏薑製各一兩

連翹去心　陳皮

萊菔子炒各五錢


右為細末麪糊為丸麥芽湯化服

傷食吐

過食傷胃腹脹熱惡食口臭吐酸黏眼胞虛浮身潮熱

須服三棱和胃煎

註傷食吐者因小兒飲食無節過食油膩麪食等物以致壅塞中脘而成也其證肚腹脹熱惡食口臭頻吐酸黏眼胞虛浮身體潮熱治宜清胃和中為主先用三棱丸止其吐再用和胃湯化其滯而病



漸愈矣

三稜丸

三稜煨　陳皮

半夏薑製　神麯各一兩炒

黄連薑炒　枳實麸炒

丁香各五錢

右研細末麪和為丸如黄米大每服二十丸食後

薑湯下

和胃湯

陳皮　半夏薑製

縮砂仁研　蒼术炒

厚樸薑炒　藿香葉

香附炒　甘草炙

山查　神麯炒

引用生薑水煎服

方歌 和胃湯治嘔吐頻陳皮半夏縮砂仁蒼术厚樸藿

香葉香附甘草山查神

夾驚吐

食時觸異吐青涎身熱心煩睡不安截風觀音散極妙


止吐定吐丸可痊

註夾驚吐者多因飲食之時忽被驚邪所觸而致吐

也其證頻吐青涎身體發熱心神煩躁睡卧不寧

先用全蠍觀音散截其風次用定吐丸止其嘔而

病可痊矣



全蠍觀音散

人參三錢　黃耆蜜炙

扁豆炒　茯苓各五錢


蓮肉三錢去心　木香一錢五分煨

白芷二錢　羌活

防風　天麻

全蠍各三錢去毒　炙甘草一錢五分

右為細末薑棗煎湯調服量兒大小與之



定吐丸

丁香二十一粒　蠍梢四十九條去毒

半夏三個薑製

右為細末令勻煮棗肉為丸如黍米大每服七丸金器煎湯化服

痰飲吐

痰飲壅盛在胸中痰因氣逆嘔吐成眩暈面青吐涎飲香砂二陳六君寧


註 痰飲吐者由小兒飲水過多以致停留胸膈變而為痰痰因氣逆遂成嘔吐之證其候頭目眩暈面青嘔吐涎水痰沫也宜用香砂二陳湯虛者香砂六君子湯治之

二陳湯 方見哯乳 本方加藿香砂仁

香砂六君子湯

藿香　縮砂仁

白朮土炒　人參




茯苓　半夏薑製
陳皮　甘草炙
引用生薑水煎服
方歌　香砂六君虚痰吐藿香縮砂共白朮人參茯苓及
陳皮半夏甘草同煎服
蟲吐
蟲吐胃熱或胃寒色變時疼嘔青涎寒熱當以陰陽辨
化蟲加減理中痊

註蟲吐之證有二有以胃經熱蒸者有以胃經寒迫者皆能令蟲不安擾亂胃中而作吐也其證脣色或紅或白胃口時痛時止頻嘔清涎屬寒屬熱當從陰陽之證辨之熱者化蟲丸主之寒者加減理中湯主之

化蟲丸

蕪荑五錢　鶴蝨

苦楝根皮　胡粉



史君子肉　檳榔各一兩

枯礬二錢五分

右為細末麪糊為丸量兒大小用之

加減理中湯

人參　乾薑

白朮土炒　川椒

引用烏梅一箇水煎服

方歌　加減理中寒吐蟲人參乾薑白朮從川椒烏梅伏


蟲動煎成服下即安寧

虛吐

虛吐多因胃弱成神倦顖動睡露睛自利不渴頻嘔吐丁沉四君藥最靈

註虛吐之證多因胃氣虛弱不能消納乳食致成此證也其精神倦怠顖門煽動睡卧露睛自利不渴頻頻嘔吐者以丁沉四君子湯治之

丁沉四君子湯



人參　　白朮土炒

茯苓　　炙甘草

丁香　　沉香


引用煨薑水煎服

方歌　胃虛嘔吐不思食丁沉四君治最宜參朮苓草補

其胃丁香沉香温其脾

實吐

小兒實吐腹脹滿二便不利痞硬疼發渴思涼吐酸臭



三一承氣可收功

註 實吐者小兒平素壯實偶爾停滯胸腹脹滿二便秘澁痞硬疼痛口渴思飲寒凉吐多酸臭也宜用三一承氣湯下之二便利而吐止矣

三一承氣湯

芒消　生大黄

枳實麩炒　甘草生

厚樸薑炒

引用生薑水煎服

方歌 三一承氣治實吐滌滯通塞功最著芒消相配生大黄枳實甘草同厚樸

寒吐

朝食暮吐為冷吐乳食不化不臭酸四肢厥冷面脣白薑橘丁萸理中煎

註 寒吐者皆因小兒過食生冷或乳母當風取涼使寒氣入乳小兒飲之則成冷吐之證其候朝食暮

吐乳食不化吐出之物不臭不酸四肢逆冷面脣色白治當温中定吐胃微寒者薑橘散主之寒甚者丁萸理中湯主之


薑橘散

白薑 二錢　陳皮 一兩

炙甘草 一錢

右為細末每服一錢温棗湯調服

理中湯 方見不乳 本方加丁香吳茱萸



熱吐

食入即吐因胃熱口渴飲冷吐酸涎身熱脣紅小便赤

加味温膽湯可痊

註熱吐之證或因小兒過食煎煿之物或因乳母過食厚味以致熱積胃中遂令食入即吐口渴飲冷嘔吐酸涎身熱脣紅小便赤色治宜清熱為主加味温膽湯主之

加味温膽湯

陳皮　半夏薑製

茯苓　麥冬去心

枳實麩炒　生甘草

竹茹　黃連薑炒

引用燈心水煎服

方歌 熱吐須用温膽湯陳皮半夏茯苓良麥冬枳實生甘草竹茹黃連水煎嚐

瀉證門

瀉證總括

小兒泄瀉認須清傷乳停食冷熱驚藏寒脾虛飧水瀉分消溫補治宜精

註瀉之一證多因脾被濕侵土不勝水而成然致病之原各異或乳食停滯不化或感受寒暑之氣或驚邪外觸或藏受寒冷或脾虛作瀉更有飧瀉水瀉之證致疾之因不同而調治之法亦異醫者詳細辨之或分消或溫補因證施治庶不誤矣


傷乳食瀉

乳食過傷瀉酸朣噫臭腹熱脹滿疼口渴惡食溺赤澁

保安平胃奏神功

註傷乳食瀉者因乳食過飽損傷脾胃乳食不化故頻瀉酸朣也噫臭腹熱脹滿疼痛口渴惡食小便赤澁須用保安丸消其滯次用平胃散和其脾庶積消而瀉止矣

保安丸



香附醋炒　縮砂仁各一兩

白薑炮　青皮醋炒

陳皮　三稜

莪朮　炙甘草各五錢

右為細末麪糊為丸量兒大小與之白湯化下

平胃散方見哯乳

中寒瀉

過食生冷中寒瀉腸鳴脹痛瀉澄清面白肢冷懶飲食

理中訶子散堪行


註中寒瀉者因過食生冷以致寒邪凝結腸鳴腹脹時復疼痛所瀉皆澄澈清冷面色淡白四肢逆冷飲食懶進也温中理中湯主之止瀉訶子散主之

理中湯方見不乳

訶子散

訶子麪煨　肉豆蔻麪煨

白术土炒　人參



茯苓　木香煨各一兩

陳皮　炙甘草各五錢


右為細末每服一錢薑湯調服

火瀉

火瀉内熱或傷暑暴注下迫腹痛疼煩渴瀉黄小便赤

玉露四苓可收功

註火瀉者皆因藏府積熱或外傷暑氣故瀉時暴注下迫肚腹疼痛心煩口渴瀉多黄水小便赤色也



先用玉露散清其熱再用四苓湯利其水庶得其要矣

玉露散

寒水石　石膏各一兩

甘草三錢

右為細末量兒大小温湯無時調服

四苓湯

茯苓　白朮土炒

豬苓　　澤瀉

引用燈心水煎服

方歌 火瀉小便不利通利水除濕用四苓茯苓白朮豬苓澤燈心為引共煎成

驚瀉

驚瀉因驚成泄瀉夜卧不安晝惕驚糞稠若膠帶青色鎮驚養脾服通靈

註驚瀉者因氣弱受驚致成此證其候夜卧不安晝

則驚惕糞稠若膠色青如苔治宜鎮心抑肝先以益脾鎮驚散定其驚次以養脾丸理其脾庶可愈矣


益脾鎮驚散

人參錢半　白朮土炒

茯苓各三錢　硃砂八分

鈎藤二錢　甘草五分炙

右為細末每服一錢燈心湯調服



養脾丸

人參　白术土炒

當歸　川芎各三錢

青皮醋炒　木香煨

黃連薑炙　陳皮各二錢

神麯炒　山查

縮砂仁　麥芽炒各一錢

右研細末神麯糊為丸如麻子大每服二十丸陳

倉米飲下

臍寒瀉

剪臍失護受寒冷糞色青白腹痛鳴散寒和氣飲極效
温補調中湯最靈

註臍寒瀉者多因斷臍失護風冷乘入傳於大腸遂成寒瀉之證其候糞色青白腹痛腸鳴先用和氣飲温散之再以調中湯温補之庶治得其要矣

和氣飲

蒼术　紫蘇
防風　赤苓
豆豉　藿香
陳皮　厚樸薑炒
炙甘草
引用生薑燈心水煎服
方歌 和氣飲具温散功蒼术紫蘇共防風赤苓豆豉藿
香葉陳皮厚樸甘草同

調中湯

人參　　茯苓

藿香　　白朮土炒

炙甘草　　木香煨

香附製　　縮砂仁

引用煨薑水煎服

方歌　臍寒瀉用調中湯人參白朮煨木香藿香茯苓同香附縮砂炙草引煨薑

脾虛瀉

脾虛食後即作瀉腹滿不渴少精神面黄懶食肌消瘦參苓白术奏奇勲

註脾虛瀉者多因脾不健運故每逢食後作瀉腹滿不渴精神短少面黄懶食肌肉消瘦也宜用參苓白术散以補脾其瀉自止

參苓白术散方見脾疳

飧瀉

清氣下陷失健運完穀不化飧瀉名補中益氣湯升補


久瀉腸滑用四神

註飧瀉者或因春傷風邪清氣下陷脾失健運以致完穀不化也治者須補養脾土用補中益氣湯升其中氣若泄瀉日久腸滑不禁者用四神丸治之

補中益氣湯

人參　黄耆蜜炙

當歸土炒　白朮土炒



炙甘草　陳皮

升麻土炒　柴胡醋炒

引用薑棗水煎服

古歌　飧瀉多因清陽陷補中益氣湯最驗參耆歸朮草

陳皮升麻柴胡功無限

四神丸

補骨脂四兩　五味子

肉豆蔻各二兩麪裹煨　吳茱萸一兩水浸炒


右為細末生薑棗肉為丸每服一錢米飲下

水瀉

脾胃濕盛成水瀉懶食溏瀉色多黃清濁不分溺短濇

胃苓升陽除濕湯

註 水瀉者皆因脾胃濕盛以致清濁不分變成水瀉之證其候小便短濇懶食溏瀉色黃宜用胃苓湯以除濕若瀉久不止則用升陽除濕湯治之其證自愈



胃苓湯

蒼朮炒　陳皮

厚樸薑炒　白朮

茯苓　炙甘草

肉桂　澤瀉

豬苓

引用生薑紅棗水煎服

方歌　濕瀉胃苓湯堪行蒼朮陳皮厚樸同白朮茯苓炙

甘草肉桂澤瀉共豬苓

升陽除濕湯

蒼朮炒　陳皮

防風　神麯炒

麥芽炒　澤瀉

炙甘草　升麻


羌活　柴胡

豬苓


引用生薑水煎服

方歌　升陽除濕瀉不停蒼朮陳皮共防風神麯麥芽澤

甘草升麻羌活柴豬苓



御纂醫宗金鑑卷五十二



總校官庶吉士臣張能照

校校官檢討臣王鍾健

謄録監生臣孫起鵬